Biotopname Torfmoos-Seggenried im Seegrund 1,9 km NNW Gegensee		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X						X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>		0	5	1	0	1	2	2	4	0	0	1
	X																																																			
	X																																																			
0	5	1	0																																																	
1	2	2																																																		
4	0	0	1																																																	
Standort /Geologie Senke/Verlandungsmoor+Kesselmoor/Sandebene				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Naturraum Ueckermünder Heide 2 2 1				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>6</td><td>0</td></tr> </table>			6	0		6	0																																									
	6	0																																																		
	6	0																																																		
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Ahlbeck		Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>0</td></tr> </table>		0	1	7	7	0	1	7	8	5	6	5	0																																			
0	1	7	7																																																	
0	1	7	8																																																	
5	6	5	0																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 04475				Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					7																																											
			7																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ NSG 1 LSG ☐ BR ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐		FiB ☐ FFH-Geb. 1 Wald-Totalreservat ☐																																																
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																
Code M S T		M S W		U M V U M L																																																
% 8 5		1 5																																																		
Vegetationseinheiten Torfmoos-Seggen-Wollgrasried, Schnabelseggen-Kiefern-Moorbirkengehölz, Torfmoos-Ohrweidengebüsch																																																				
Habitate + Strukturen D H M																																																				
Beschreibung / Besonderheiten Torfmoos-Seggenried im Ahlbecker Seegrund auf naturnahem Verlandungs- und Kesselmoor innerhalb der bewaldeten Sandebene von Feuchtwald (Biotop 0410-344B4023 und Braunmoos-Seggenrieden (Biotop 4002) umgeben. Auf nassen, wenig gestörten Torfen hat sich infolge eines zunehmenden Regenwassereinflusses und damit einhergehender mesotroph-saurer Standortbedingungen ein Mosaik aus Torfmoos-Seggenrieden in der Ausbildung als Torfmoos-Seggen-Wollgrasried und Gehölzstadien der Sauer-Zwischenmoore als Schnabelseggen-Kiefern-Moorbirkengehölz bzw. Torfmoos-Ohrweidengebüschen herausgebildet. Aus floristischer Sicht verdient neben dem Vorkommen von Torfmoos-Seggen-Wollgrasried und Torfmoos-Ohrweidengebüsch als gefährdete Pflanzengesellschaften auch das dominante bzw. z.T. zahlreiche Auftreten von Schnabelsegge bzw. Kriechweide, Wiesensegge, Rundblättrigem Sonnentau, Schmalblättrigem Wollgras und Sumpflblutauge sowie des Moooses Aulacomnium palustre besondere Beachtung.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☒	Artenreichtum (Flora)	☐	vielfältige Standortverhältnisse	☐																																																
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐	historische Nutzungsformen	☐																																																
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐	aktuelle Nutzung	☐																																																
☒	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐	Flächengröße / Länge	☐																																																
☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐	Umgebung relativ störungsarm	☐																																																
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐	landschaftsprägender Charakter	☐																																																
☒	typische Zonierung von Biotoptypen	☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion	☐																																																
☐	Struktur- und Habitatreichtum	☐		☐																																																
Gefährdung																																																				
					keine Gefährdung ☒																																															
Empfehlung																																																				

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10						Biotop-Nr.						
				0	5	1	0	-	1	2	2	-	4	0	0	1
Substrat	Trophie	Wasserstufe	Relief	Exposition												
k g	k g	k g	k g	k g	k g											
☐ g Torf, wenig gestört	☐ ☐ dystroph	☐ ☐ trocken	☐ ☐ g eben	☐ ☐ N												
☐ ☐ Torf, degradiert	☐ ☐ oligotroph	☐ ☐ mäßig trocken	☐ ☐ wellig	☐ ☐ NO												
☐ ☐ Antorf	☐ ☐ g mesotroph	☐ ☐ wechselfeucht	☐ ☐ kuppig	☐ ☐ O												
☐ ☐ Sand	☐ ☐ eutroph	☐ ☐ frisch	☐ ☐ düinig	☐ ☐ SO												
☐ ☐ Kies / Steine	☐ ☐ poly- / hypertroph	☐ ☐ feucht	☐ ☐ Berg / Rücken	☐ ☐ S												
☐ ☐ Lehm		☐ ☐ sehr feucht	☐ ☐ Riedel	☐ ☐ SW												
☐ ☐ Ton		☐ ☐ g naß	☐ ☐ Flachhang <= 9°	☐ ☐ W												
☐ ☐ Halbkalk / Kalk		☐ ☐ k offenes Wasser	☐ ☐ Steilhang > 9°	☐ ☐ NW												
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm			☐ ☐ Nische													
☐ ☐ gestörter Boden		☐ ☐ quellig	☐ ☐ Senke / Streckensenke													
			☐ ☐ Kerbtal													
			☐ ☐ Sohlental													

NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung		k g	
Nutzungsintensität		Umgebung					
k g	k g	k g	k g				
☐ ☐ intensiv	☐ ☐ Fischerei	☐ ☐ Acker / Gartenbau	☐ ☐ Fließgewässer				
☐ ☐ extensiv	☐ ☐ Angeln	☐ ☐ Ackerbrache	☐ ☐ Stillgewässer				
☐ ☐ aufgelassen	☐ ☐ Erholung	☐ ☐ Grünland, intensiv	☐ ☐ Trockenbiotop				
☐ ☐ g keine Nutzung	☐ ☐ Kleingartenbau	☐ ☐ Grünland, extensiv	☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten				
	☐ ☐ Erwerbsgartenbau	☐ ☐ Laub- / Mischwald	☐ ☐ Weg				
	☐ ☐ Ferienhäuser	☐ ☐ Nadelwald	☐ ☐ Straße, Parkplatz				
	☐ ☐ Bodenentnahme	☐ ☐ g Feuchtwald / -gebüsch	☐ ☐ Bahnanlage				
	☐ ☐ Verkehr	☐ ☐ Gehölz	☐ ☐ Gewerbe / Industrie				
	☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage	☐ ☐ g Röhricht / Feuchtbrache	☐ ☐ Silo / Stallanlage				
	☐ ☐ sonstige Nutzung:	☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur	☐ ☐ Gebäude / Siedlung				
		☐ ☐ Graben	☐ ☐ Spülfeld / Halde				
			☐ ☐ Bodenentnahme				

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex rostrata **Sphagnum fallax**

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Aulacomnium palustre Calamagrostis canescens Carex canescens Carex paniculata
 Oxycoccus palustris Potentilla palustris Salix aurita Salix repens repens
Sphagnum fimbriatum

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Agrostis canina Betula pubescens Carex nigra Carex pseudocyperus
 Cirsium palustre **Drosera rotundifolia** **Dryopteris cristata** Equisetum fluviatile
Eriophorum angustifolium Juncus articulatus Juncus effusus Lythrum salicaria
 Molinia caerulea Pinus sylvestris Polytrichum strictum Typha latifolia
Viscum album

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 18.02.2004
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: IBS-Teppke	Foto: 3 Folgeseiten: 0