Biotopname Bruchwald/Feuchtgebüschkomplex ca. 0,5 km westlich Pomellen		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																						TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr> </table>		0	5	1	0	4	4	3	4	0	1	5
0	5	1	0																																																	
4	4	3																																																		
4	0	1	5																																																	
Standort /Geologie Seebecken in der welligen Grundmoränenhochfläche		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							X											Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
	X																																																			
Naturraum Kuppiges Uckermärkisches Lehmgelände 3 3 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td></tr> </table>		2	4	2	0	1	5	2																																								
2	4	2																																																		
0	1	5	2																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Nadrensee		Bild-Nr. Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>4</td></tr> </table>					3	0	0	8	4																																							
			3																																																	
0	0	8	4																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 08723				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
Code V W N		W N A		V R P																																																
% 7 0		2 0		1 0																																																
Vegetationseinheiten Grauweiden-Gebüsch, Sumpffarn-Erlen-Bruchwald, Schil-Röhricht																																																				
Habitats + Strukturen		H S O		H Z I		H T A																																														
						H T B																																														
						H A O																																														
						H A J																																														
Beschreibung / Besonderheiten Westlich von Pomellen liegt eingetieft in die wellige Grundmoränenhochfläche ein See, dessen Becken fast zweigeteilt ist. Zwischen beiden Teilbecken liegt ein slawischer Burgwall, der nur an der West- und Ostseite je eine schmale Verbindung offenließ. Später wurde auch hier ein befahrbarer Damm geschüttet. Diese weitgehende Abtrennung trug sicher wesentlich zur starken Verlandung des nördlichen Teilbeckens bei. Während 1991 fast das gesamte Teilbecken noch von einer offenen Wasserfläche eingenommen wurde (Luftbild), hat sich in der Folgezeit ein Grauweiden-Gebüsch entwickelt, welches den größten Teil des Beckens ausfüllt. Neben der Grau-Weide kommen auch junge Erlen und einige Birken vor. In den gehölzarmen Lücken wächst viel Schilf. Außerdem haben auch Thelypteris palustris und Carex paniculata höhere Anteile. Im Nordosten kommt noch Typha latifolia hinzu. Im westlichen Teil wächst ein deutlich höherer Sumpffarn-Erlen-Bruchwald. In der Baumschicht mit einem Kronenschluß von ca. 80 % kommen neben der Erle auch Birken vor. Die Grau-Weiden der Strauchschicht sind zum Teil bereits abgestorben. In der Außenzone sind sie deutlich vitaler. Offene Wasserflächen waren zum Kartierungszeitpunkt nicht vorhanden. Die Flächen konnten alle begangen werden.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora)				☐ vielfältige Standortverhältnisse																																																
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				☐ historische Nutzungsformen																																																
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐ aktuelle Nutzung																																																
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐ Flächengröße / Länge																																																
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☐ Umgebung relativ störungsarm																																																
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐ landschaftsprägender Charakter																																																
☒ typische Zonierung von Biotoptypen				☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																
☒ Struktur- und Habitatreichtum																																																				
Gefährdung																																																				
							keine Gefährdung ☒																																													
Empfehlung ohne																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 1 0 - 4 4 3 - 4 0 1 5

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	k	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	g	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐	k	Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	k	Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Phragmites australis

Thelypteris palustris

Pflanzenarten ±zahlreich
Betula pubescens
Carex pseudocyperus
Juncus effusus
Salix cinerea

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Calamagrostis canescens
Deschampsia cespitosa
Lycopus europaeus
Solanum dulcamara

Carex lasiocarpa
Epilobium parviflorum
Lysimachia thyrsoiflora

Carex paniculata
Galium palustre
Lysimachia vulgaris

Pflanzenarten vereinzelt
Crataegus monogyna
Populus tremula
Ulmus laevis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Epilobium hirsutum
Quercus robur

Fraxinus excelsior
Salix alba

Nuphar lutea
Typha angustifolia

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 24.10.2004

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Voigtländer

Foto: 2

Folgeseiten: 0