

Biotopname														TK10				Biotop-Nr.						
Kleine Pionierflur im Wald östlich Polz						X								0 6 0 4 - 4 1 4 - 4 0 0 4										
Standort /Geologie																								
aufgeblasene Binnendüne / Talsande																								
Naturraum Südwestliche Talsandniederungen mit Elde, Sude und Rögnitz																								
5 1 0														Luftbild-Nr.										
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt						Größe in ha				Film-Nr.				Bild-Nr.				
Ludwigslust						Dömitz, Stadt						Länge in m				-				-				
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis												min. Breite in m				-				-				
13438												max. Breite in m				-				-				
Schutzmerkmale						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil						NP 1				FiB								
geschützt nach §20 LNatG M-V X						NLP FND NP 1						BR 1				FFH-Geb. 1								
						NSG LSG 1						FnB				Wald-Totalreservat								
ND GLB																								
Hauptcod.		Nebencode														Überlagerungscode								
Code		T	P	S	B	B	J												U	G	D			
%			8	5		1	5																	
Vegetationseinheiten																								
flechtenreiche Widertonmoos-Silbergras-Pionierflur, junge Kiefern																								
Habitats + Strukturen					D	G	O	D	H	F														
Beschreibung / Besonderheiten																								
Auf dem oligo-mesotrophen, trockenen - mäßig trockenen zu einer Binnendüne aufgeblasenen Talsanden der nahe gelegenen Löcknitz-Niederung ist eine z. T. lückige Silbergras-Pionierflur angesiedelt. Silbergras ist dabei mit Behaartem Widertonmoos und Rentierflechten vergesellschaftet. Vereinzelt befindet sich Kieferngehölz auf der Fläche. Nach Norden schließt sich auf dem Binnendünenrücken lockerer Kiefernwald an. Im Süden, Westen und Osten wird der langgestreckte Biotop von jungem Kieferngehölz begrenzt.																								
Wertbestimmende Kriterien																								
Artenreichtum (Flora)										vielfältige Standortverhältnisse														
Vorkommen seltener / typischer Tierarten										historische Nutzungsformen														
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung														
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge														
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm														
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops										landschaftsprägender Charakter														
typische Zonierung von Biotoptypen										Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion														
Struktur- und Habitatreichtum																								
Gefährdung																								
keine Gefährdung X																								
Empfehlung																								

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.											
				0	6	0	4	-	4	1	4	-	4	0	0	4			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
☐ ☐ Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ eben				☐ ☐ N			
☐ ☐ Torf, degradiert				☐ ☐ g oligotroph				☐ ☐ g mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO			
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ g mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O			
☐ ☐ g Sand				☐ ☐ eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ g düinig				☐ ☐ SO			
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S			
☐ ☐ Lehm								☐ ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW			
☐ ☐ Ton								☐ ☐ naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W			
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW			
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische							
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ Senke / Strecksenke							
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal							
												☐ ☐ Sohlental							
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität								Umgebung											
k g				k g				k g				k g				k g			
☐ ☐ intensiv				☐ ☐ Fischerei				☐ ☐ Acker / Gartenbau				☐ ☐ Fließgewässer							
☐ ☐ extensiv				☐ ☐ Angeln				☐ ☐ Ackerbrache				☐ ☐ Stillgewässer							
☐ ☐ aufgelassen				☐ ☐ Erholung				☐ ☐ Grünland, intensiv				☐ ☐ Trockenbiotop							
☐ ☐ g keine Nutzung				☐ ☐ Kleingartenbau				☐ ☐ Grünland, extensiv				☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten							
				☐ ☐ Erwerbsgartenbau				☐ ☐ Laub- / Mischwald				☐ ☐ Weg							
				☐ ☐ Ferienhäuser				☐ ☐ g Nadelwald				☐ ☐ Straße, Parkplatz							
				☐ ☐ Bodenentnahme				☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch				☐ ☐ Bahnanlage							
Nutzungsart																			
k g																			
☐ ☐ Acker				☐ ☐ Verkehr				☐ ☐ Gehölz				☐ ☐ Gewerbe / Industrie							
☐ ☐ Wiese				☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage				☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache				☐ ☐ Silo / Stallanlage							
☐ ☐ Weide				☐ ☐ sonstige Nutzung:				☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur				☐ ☐ Gebäude / Siedlung							
☐ ☐ forstliche Nutzung								☐ ☐ Graben				☐ ☐ Spülfeld / Halde							
												☐ ☐ Bodenentnahme							
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
Corynephorus canescens																			
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
Cladonia spec. Polytrichum piliferum																			
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
Carex arenaria Pinus sylvestris																			
Angaben zur Fauna																			
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 19.08.1998							
												Datum letzte Begehung:							
Bearbeiter/in: IBS-Dubbert												Foto: 1		Folgeseiten: 0					