

Biotopname	Trockenbiotop südlich Zuggelrade
Standort /Geologie	Binnendüne
Naturraum	Südwestliche Talsandniederungen mit Elde, Sude und Rögnitz 5 1 0
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Ludwigslust
Gemeinde / Stadt	Steesow
Ild. Nr. im Biotopverzeichnis	13479
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V X
Hauptcod.	Nebencode
Code	T P S T Z T B B J % 7 5 2 4 1
Vegetationseinheiten	Widertonmoos-Silbergras-Pionierflur, flechtenreiche Heidekraut-Heide
Habitats + Strukturen	D G O D H G
Beschreibung / Besonderheiten	Inmitten eines Kiefernforstgebietes gelegener ca. 500 m² großer offener Bereich einer Binnendüne. Es handelt sich um eine kleine Dünenkuppe. Auf oligotrophem trockenem Sand dominiert eine Widertonmoos-Silbergras-Pionierflur, welche von kleineren vegetationslosen Bereichen unterbrochen wird. Am Nordosthang hat sich eine flechtenreiche Heidekraut-Heide herausgebildet. Einzelne Kiefern befinden sich innerhalb der Biotopfläche. Kiefernwald umgibt den Biotop.
Wertbestimmende Kriterien	Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltsame / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum
Gefährdung	keine Gefährdung X
Empfehlung	

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.												
				0	6	0	4	-	4	2	2	-	4	0	2	6				
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition				
k g				k g				k g				k g				k g				
☐	☐	Torf, wenig gestört		☐	☐	dystroph		☐	☐	☒	trocken		☐	☐	eben		☐	☐	N	
☐	☐	Torf, degradiert		☐	☒	oligotroph		☐	☐	mäßig trocken		☐	☐	wellig		☐	☐	NO		
☐	☐	Antorf		☐	☐	mesotroph		☐	☐	wechselfeucht		☐	☐	kuppig		☐	☐	O		
☐	☒	Sand		☐	☐	eutroph		☐	☐	frisch		☐	☒	düinig		☐	☐	SO		
☐	☐	Kies / Steine		☐	☐	poly- / hypertroph		☐	☐	feucht		☐	☐	Berg / Rücken		☐	☐	S		
☐	☐	Lehm						☐	☐	sehr feucht		☐	☐	Riedel		☐	☐	SW		
☐	☐	Ton						☐	☐	naß		☐	☐	Flachhang <= 9°		☐	☐	W		
☐	☐	Halbkalk / Kalk						☐	☐	offenes Wasser		☐	☐	Steilhang > 9°		☐	☐	NW		
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm										☐	☐	Nische						
☐	☐							☐	☐	quellig		☐	☐	Senke / Strecksenke						
☐	☐	gestörter Boden										☐	☐	Kerbtal						
☐	☐											☐	☐	Sohllental						
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																				
Nutzungsintensität								Umgebung				k g								
k g				k g				k g				k g								
☐	☐	intensiv		☐	☐	Fischerei		☐	☐	Acker / Gartenbau		☐	☐	Fließgewässer						
☐	☐	extensiv		☐	☐	Angeln		☐	☐	Ackerbrache		☐	☐	Stillgewässer						
☐	☐	aufgelassen		☐	☐	Erholung		☐	☐	Grünland, intensiv		☐	☐	Trockenbiotop						
☐	☒	keine Nutzung		☐	☐	Kleingartenbau		☐	☐	Grünland, extensiv		☐	☐	Grünanlage / Kleingarten						
				☐	☐	Erwerbsgartenbau		☐	☐	Laub- / Mischwald		☐	☐	Weg						
				☐	☐	Ferienhäuser		☐	☒	Nadelwald		☐	☐	Straße, Parkplatz						
				☐	☐	Bodenentnahme		☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch		☐	☐	Bahnanlage						
Nutzungsart				☐	☐	Verkehr		☐	☐	Gehölz		☐	☐	Gewerbe / Industrie						
k g				☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage		☐	☐	Röhricht / Feuchtrache		☐	☐	Silo / Stallanlage						
☐	☐	Acker		☐	☐	sonstige Nutzung:		☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur		☐	☐	Gebäude / Siedlung						
☐	☐	Wiese						☐	☐	Graben		☐	☐	Spülfeld / Halde						
☐	☐	Weide										☐	☐	Bodenentnahme						
☐	☐	forstliche Nutzung																		
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																				
Calluna vulgaris				Corynephorus canescens																
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																				
Cladonia spec.				Polytrichum piliferum																
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																				
Pinus sylvestris																				
Angaben zur Fauna																				
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 05.11.1998								
												Datum letzte Begehung:								
Bearbeiter/in: IBS-Pries												Foto: 1		Folgeseiten: 0						