Biotopname Hochstaudenflur-Gebüsch-Komplex n."Rammkoppel"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>		0	6	0	5	2	2	1	4	0	1	4
	X																																																			
0	6	0	5																																																	
2	2	1																																																		
4	0	1	4																																																	
Standort /Geologie vermoorte Senke/Endmoräne		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Ruhner Berge und Sonnenberg 5 2 1		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>9</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table>			9	4	0	0	3	4																																										
	9	4																																																		
0	0	3	4																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim		Gemeinde / Stadt Marnitz																																																		
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 16161		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr> </table>					0													4	3	4	7																													
			0																																																	
4	3	4	7																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Hauptcod.		Nebencode																																																		
Code V H F		V W N V W D V Q F																																																		
% 4 6		3 3 1 2 9																																																		
Vegetationseinheiten waldsimsenreiche Waldengelwurz-Gilbweiderich-Hochstaudenflur, Waldengelwurz-Korbweiden-Gebüsch, Milzkraut-Brunnenkressen-Grauweiden-Gebüsch, Brennessel-Grauweiden-Gebüsch, Berlen-Bachehrenpreis-Quellflur																																																				
Habitate + Strukturen D H M																																																				
Beschreibung / Besonderheiten In einem Teil einer von Grünland umgebenen Senke ist ein Feuchtbiotopkomplex aus Hochstaudenfluren, Weiden-Gebüsch und Quellflur angesiedelt. Auf den meist feuchten - sehr feuchten vererdeten Torfen nimmt im SO gelegen die feuchte Hochstaudenflur aus Gilbweiderich, Waldengelwurz, Mädesüß, Waldsimse, Bachnelkenwurz etc. den Hauptanteil ein. Sie weist z. T. auch Störzeiger wie Wiesenfuchsschwanz und Brennessel auf und wird von Gebüsch aus Grau- und Korbweide umgeben, die sowohl entwässert als auch feucht sind. Nach NW wird der Standort quellig, die Grauweiden-Gebüsche besitzen eine Bodenvegetation aus Milzkraut und Brunnenkresse. Die am NW-Rand des Biotopes liegende, z. T. von diesen Grauweiden-Gebüsch umgebene Quellkuppe besiedeln Berle und Bachehrenpreis. Das überschüssige Wasser fließt in einen schmalen Graben ab. Großflächig begrenzen Ruderalfluren und Gehölze bzw. Gebüsche den Biotop.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐	Artenreichtum (Flora)	☐	vielfältige Standortverhältnisse																																																	
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐	historische Nutzungsformen																																																	
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐	aktuelle Nutzung																																																	
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐	Flächengröße / Länge																																																	
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐	Umgebung relativ störungsarm																																																	
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐	landschaftsprägender Charakter																																																	
☐	typische Zonierung von Biotoptypen	☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																	
☐	Struktur- und Habitatreichtum	☐																																																		
Gefährdung																																																				
Y W S		keine Gefährdung ☐																																																		
Empfehlung																																																				
Z S E																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 6 0 5 - 2 2 1 - 4 0 1 4

Substrat

k	g	
☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie

k	g	
☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief

k	g	
☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition

k	g	
☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k	g	
☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k	g	
☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

k	g	
☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant
Lysimachia vulgaris

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Salix viminalis

Scirpus sylvaticus

Pflanzenarten ±zahlreich
Angelica sylvestris
Filipendula ulmaria
Salix cinerea

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Berula erecta
Lotus uliginosus
Urtica dioica

Cirsium oleraceum
Nasturtium officinale
Veronica beccabunga

Equisetum fluviatile
Poa trivialis

Pflanzenarten vereinzelt
Alopecurus pratensis
Equisetum palustre
Lythrum salicaria

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex acutiformis
Glyceria fluitans
Myosotis palustris

Chrysosplenium alternifolium
Holcus lanatus
Rubus idaeus

Epilobium palustre
Lathyrus pratensis

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 15.10.1999

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Weinauge

Foto: 2

Folgeseiten: 0