Biotopname Riedkomplex NW Neuhof im NO Lüttenhägener Forst		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X																			TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">8</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>		0	6	0	8	-	2	2	1	-	4	0	1	0	Biotop-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>		4	0	1	0
	X																																																
0	6	0	8	-	2	2	1	-	4	0	1	0																																					
4	0	1	0																																														
Standort /Geologie Kleines Moor innerhalb der Pommerschen Hauptendmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																													
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0				Film-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td> </tr> </table>		2	1	2	-	0	0	1	1	Bild-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td> </tr> </table>		0	0	1	1																														
2	1	2	-	0	0	1	1																																										
0	0	1	1																																														
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Feldberger Seenlandschaft		Luftbild-Nr.		Größe in ha		Länge in m		min. Breite in m		max. Breite in m																																					
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 19970																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ 1 ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																															
		Hauptcod.		Nebencode								Überlagerungscode																																					
		Code V G R		V G S																																													
		% 6 0		4 0																																													
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Ried, Sumpfreitgras-Ried,																																																	
Habitate + Strukturen																																																	
Beschreibung / Besonderheiten Ca. 1,1 km nordwestlich von Neuhof im Bereich der Pommerschen Hauptendmoräne und innerhalb eines Buchen-Mischwaldes liegt eine vermoorte Mulde mit einem mäßig eutrophen Kesselmoor. Es wurde über einen Graben entwässert. Dieser wird aber nicht mehr unterhalten. Der größte Teil wird von einem Sumpfreitgras-Sumpfschilf-Ried eingenommen. Es konzentriert sich besonders auf die nördliche Hälfte. Vor allem im Südtel dominiert anstelle der Sumpf-Segge das Sumpf-Reitgras. Es bildet hier ein eigenes Ried. Daneben wachsen im Moor eine Birkengruppe mit etwas Torfmoos und wenig Carex rostrata sowie einige Grau-Weiden. Einen hohen Anteil besitzt auch Agrostis canina. Dagegen fehlt im Gegensatz zu den meisten anderen kleinen Mooren dieses Gebietes Calla palustris.																																																	
Wertbestimmende Kriterien																																																	
☐ Artenreichtum (Flora)		☐ vielfältige Standortverhältnisse		☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten		☐ historische Nutzungsformen		☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☐ aktuelle Nutzung		☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☐ Flächengröße / Länge																																			
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☐ Umgebung relativ störungsarm		☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☐ landschaftsprägender Charakter		☐ typische Zonierung von Biotoptypen		☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion		☐ Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung Bei gleichbleibenden Wasserständen keine Gefährdung																																																	
												keine Gefährdung ☐																																					
Empfehlung Mindestens Erhaltung der gegenwärtigen Grundwasserstände																																																	

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 6 0 8 - 2 2 1 - 4 0 1 0

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Agrostis stolonifera

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Calamagrostis canescens Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Betula pubescens Carex rostrata Dryopteris carthusiana Eriophorum vaginatum
Galium palustre Impatiens parviflora Juncus effusus Lycopodium europaeus
Lysimachia thyrsoiflora Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Peucedanum palustre
Potentilla palustris Salix cinerea Solanum dulcamara

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 11.09.2006

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Voigtländer

Foto: 1

Folgeseiten: 0