

Informationen zur Gebietscharakterisierung;
Arbeitsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur geplanten Nachmeldung von FFH-Gebieten im
Küstenmeer sowie über die geplante neue Kulisse von Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA=Special
Protection Areas) im Land Mecklenburg-Vorpommern; Arbeitsstand: April 2007

| Code | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|----|------|--------|---|------|------------|----|------|--------|
| SPA 23 Buchholzer-Krümmeler Heide | | | | | | | | | | | |
| Flächengröße [ha] | LKR / Ämter | | | | | Aktueller Schutzstatus | | | | | |
| 3.682 | MÜR / Röbel-Müritz | | | | | LSG: 41 Meckl. Großseenland; FFH: DE 2742-301 6 % ohne Schutzstatus | | | | | |
| Kurzbeschreibung des Gebietes | | | | | | | | | | | |
| Großseenlandschaft mit uferbegleitenden Röhrlichtzonen und größeren Laub- und Mischwaldarealen, mosaikartig verbreitete Feuchtgrünland- und Seggenriedflächen sowie Heckenstrukturen auf ärmeren Böden | | | | | | | | | | | |
| Vogelarten mit besonderem Schutz- und Maßnahmenerfordernis | | | | | | | | | | | |
| Art | Brut | Rast A1/1% | A1 | SPEC | RL M-V | Art | Brut | Rast A1/1% | A1 | SPEC | RL M-V |
| Eisvogel | X | | X | 3 | 3 | Rötmilan | X | | X | 2 | |
| Fischadler | X | | X | 3 | | Schwarzmilan | X | | X | 3 | |
| Flusseeeschwalbe | X | | X | | 2 | Schwarzspecht | X | | X | | |
| Heidelerche | X | | X | 2 | | Seeadler | X | | X | 1 | |
| Kranich | X | 1% | X | 2 | | Sperbergrasmücke | X | | X | | |
| Mittelspecht | X | | X | | | Tüpfelsumpfhuhn | X | | X | | |
| Neuntöter | X | | X | 3 | | Wachtelkönig | X | | X | | |
| Ortolan | X | | X | 2 | | Weißstorch | X | | X | 2 | 3 |
| Rohrdommel | X | | X | 3 | 1 | Wespenbussard | X | | X | | |
| Rohrweihe | X | | X | | | Zwergschnäpper | X | | X | | |
| Schutzerfordernisse (Auswahl): | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemessenen Altholzanteilen für störungsempfindliche Großvogelarten sowie Höhlenbrüter | | | | | | | | | | | |
| Sicherung und Entwicklung von unterholz- und baumartenreichen, störungsarmen Altholzbeständen für Greifvögel, Höhlen- und Waldbrüter | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung bzw. Wiederherstellung von intakten Waldmooren und -sümpfen insbesondere für Kraniche | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung störungsarmer Moore und Sümpfe (Wasserstand >20 cm, ggf. Wiederherstellung solcher Wasserstände) insbesondere für Großvogelarten, Wat- und Wasservögel | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung möglichst langer störungsarmer Uferlinien und möglichst großer störungsfreier Wasserflächen sowie eines störungsarmen Luftraumes für Wasservögel, Röhrlichtbrüter und Großvogelarten (Greifvögel, Kranich) | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Land- und Wasserflächen für störungsempfindliche Großvogelarten und Wasservögel | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung der Wasserröhrichte für Röhrlichtbrüter und Wasservögel | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung von Flachwasserzonen mit ausgeprägter Submersvegetation und Erhaltung der dazu erforderlichen Wasserqualität für Wasservögel und Seeschwalben | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines Gewässerzustandes, der nachhaltig eine für fischfressende Vogelarten optimale Fischproduktion ermöglicht und die Verfügbarkeit der Nahrungstiere sichert | | | | | | | | | | | |
| Erhalt bzw. Wiederherstellung ausgedehnter Seggen-Riede und Schilf-Röhrichte durch Sicherung dauerhaft hoher Grundwasserstände für Röhrlichtbrüter, Greifvögel und Kraniche | | | | | | | | | | | |
| Erhaltung bzw. Entwicklung von strukturreichen Ackerlandschaften mit einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen (z.B. Wegraine, Sölle, Seggen-Riede, Feldgehölze, Hecken etc.) für Greifvögel, Kraniche, Höhlen-, Hecken-, Gebüsch- und Bodenbrüter | | | | | | | | | | | |